

# 夷陵区茶叶3月份农事建议

根据近期天气预报，我区大部地区天气良好，气温逐步回升，降雨量适宜，非常适宜茶树生长。预计3月份不会发生较严重的“倒春寒”，全区绝大部分茶区将陆续开园。

**（一）春茶早施追肥。**应在开采前的30-40天施入春茶追肥，每亩施用尿素10-15公斤，开浅沟5-10公分施用。受冻茶树可在3月中上旬开沟施普通复合肥（氮磷钾养分总量25%）50公斤/亩或高浓度复合肥（氮磷钾养分总量45%）30公斤/亩。

**（二）幼龄茶树定型修剪。**定型修剪主要起培养树冠骨架，促进分枝，扩大树冠的作用。宜在春茶开采前进行，当一年生茶苗有75~80%长到30厘米以上时可离地面15~20厘米进行第一次定型修剪；第二次定型修剪在上次剪口上提高15~20厘米；第三次定型修剪上次剪口上提高10~15厘米，用篱剪将蓬面剪平即可。

**（三）受冻茶树适时修剪。**对于轻度冻害（仅叶片受害）的茶树可不修剪或酌情轻修剪；对于中度冻害（生产枝受害）或重度冻害（骨干枝受害）的茶树，应在在冻死部分与健康部分界线分明时修剪，剪口比枯死部分深1-2厘米。受冻茶树的修剪应注意宜轻不宜重。

**（四）茶厂设备调试维护。**各加工厂在春茶加工前应对加工车间和仓库等进行认真清扫消毒，通风透气，对加工设备进行维修保养和调试，联络好采摘和加工人员，制茶材料和辅助工具等准备充足，口罩、消毒剂等防护用品准备充足，提前抓好标准化加工知识和安全生产培训。

**（五）鲜叶标准及时采摘。**“前三天是宝、后三天是草”，说明采茶的季节性很强，在茶树生长季节，依照新梢伸育程度按标

准及时合理地采下芽叶，可促进腋芽和潜伏芽的萌发，从而促进新梢轮次增加，减少采摘间隔时间，并能有效地提高全年芽叶产量和质量。

**1. 幼龄茶树采摘：**贯彻“以养为主，以采为辅”的原则，采用打顶采摘法。打顶采摘法，通常在新梢长到一芽五、六叶以上，或者新梢将要停止生长时，实行采高养低，采顶留侧，摘去顶端一芽一、二叶，留下新梢基部三、四片以上真叶，以进一步促进分枝，扩展树冠。

**2. 成年茶树采摘：**贯彻“以采为主，以养为辅，多采少留，采养结合”的原则，一般全年应有一次留真叶采摘，其余采用留鱼叶采摘法，从而延长丰产年限。留真叶采摘法，一般新梢长至一芽三、四叶时，采摘一芽二叶为主，兼采一芽三叶，留下一、二片真叶在树冠上不采；留鱼叶采摘法，即不采鱼叶，也是成年茶园的基本采法，适合名优茶和大宗红绿茶的采摘。

**3. 冻害茶树采摘：**受冻茶树经修剪后，应适当留养，以恢复树冠。修剪程度较轻的茶树，春茶前期正常采摘，后期留叶采；受冻严重修剪程度较深的茶树，应留养春梢，夏茶打顶采。

**（六）病虫害综合防控。**本月尤其要注意茶饼病、小贯小绿叶蝉的发生与防治。

**1. 茶饼病：**当气温在16~20℃范围内，湿度在85%以上时最利于病害发生。采摘茶园发病初期喷70%甲基硫菌灵可湿性粉剂1000~1500倍液或75%百菌清可湿性粉剂800~1000倍液，间隔7~10d，连喷2~3次；非采摘茶园也可喷施0.6%~0.7%石灰半量式波尔多液、0.2%~0.5%硫酸铜液或12%松脂酸铜乳油600倍液，以保护茶树。特别要注意加强茶园管理，开沟排渍，保持茶园通风，清除杂草、枯枝，适当增施磷、钾肥，增强树势，提高茶树抗

病力，对受害较严重的茶树修剪掉病枝叶，并集中烧毁处理。

**2. 小绿叶蝉：**长江流域茶区越冬成虫在3月中下旬气温10℃以上时开始活动，3月下旬产卵，第一代若虫于4月上中旬出现后，隔15~30天发生一代。优先采用黄板诱杀，茶园内不间作豆类作物，及时铲除杂草，及时分批勤采，必要时适当强采，可随芽叶带走大量的虫卵和低龄若虫，降低虫口密度的同时恶化食源，控制种群密度；在湿度高的地区或季节，提倡喷洒每毫升含800万孢子的白僵菌稀释液；发生严重的茶园，越冬虫口基数大，可在3月中旬喷洒24%溴虫腈悬浮剂1500~1800倍液，以消灭越冬虫源；春茶结束后第一个高峰到来前每百叶有虫20~25头时，或第二峰前百叶虫量超过12头时，及时喷洒15%茚虫威乳油2500~3500倍液、24%溴虫腈悬浮剂1500~1800倍液、22%噻虫嗪·高效氯氟氰菊酯4500倍液、10%氯氟菊酯乳油3000倍液、10%联苯菊酯乳油3000~5000倍液。

夷陵区农业技术服务中心

2024年3月1日